MEMORIA SOPRA ALCUNE NUOVE SPECIE DI PIANTE DI GAETANO SAVI

Gaetano Savi

Poa nana. Tav. I.

Poa foliis planis pilosis, panicula spicata, spiculis subseptem floris, valvis dorso ciliatis.

Culmi alti due o tre pollici, ramosi alla base, obliqui, sottili, cilindrici, pelosi, fogliosi, con due o tre articolazioni. Foglie piane, larghe circa una linea, coperta in ambe le superficie di peli bianchi, morbidi, più lunghi, e più folti all' ingresso della guaina, la quale non ha membrana particolare. I fiori son disposti in pannocchia ristretta in spiga, lunga da sei a dieci linee, ovale, lobata. Le spighette son composte di cinque a sette fiori, e son lunghe circa due linee. Le valve sono acute, ciliate sul dorso, turchinecce prima del loro sviluppo, in seguito verdastre - *Annua*.

Nacque nel Giardino di Pisa da semi esotici innominati.

La figura *B* rappresenta una pianta di grandezza naturale.

g è una spighetta ingrandita.

Poa ramosa. Tav. I.

Poa pilosa, panicula coarctata cristata, spiculis multiflori rhombeis, culmo ramoso radicante, foliis apice involutis.

Culmi lunghi tre, o quattro pollici, piegati, o distesi, radicanti, ramosi, con rami semieretti. Rami sterili con foglie accartocciate nella sommità, formanti una punta acuta e rigida. Rami floridi con due o tre articolazioni, foglie piane, acute larghe meno di una linea, striate pelose, ciliate, con peli più folti verso l' ingresso della guaina, che è munita di una membrana cortissima, lacera. Pannocchia ristretta

ta in spiga, composta di 12-24 spighette ammucchiate, romboidali, formate di 11-23 fiori, i quali hanno la valva esterna striata, acuminata, pelosa, l' interna glabra Scariosa.

L' ho trovata nell' Erbario del fu Professore *Michel' Angiolo Tilli*.

La figura *C* rappresenta la pianta di figura naturale.

Ononis mollis. Tav. II.

Ononis pubescens, caule herbaceo, foliis superioribus simplicibus, foliolis cuneiformibus apice dentatis, pedunculis solitariis muticis unifloris, leguminibus cernuis.

Fusti erbacei, alti quattro o sei pollici, cilindrici, sottili. Foglie picciolate, con foglioline striate, cuneiformi, ottuse, dentellate in cima, le superiori semplici, le inferiori ternate. Stipole brevi, bifide, con divisioni ovali-acute, intiere. Fiori assillari, solitarj, peduncolati, orizzontali, con pedunculi muticj, più corti delle foglie: divisioni del calice profondo, lanceolate, acute, striate; corolle gialle, non più lunghe del calice: legumi poco più corti, piegati in giù, addossati al pedunculo. Tutta la pianta è coperta di peli bianchi, morbidi. *Annua*. Fiorisce nel Giugno. Trovasi in Toscana, nelle colline marittime.

La figura *A* rappresenta la pianta di grandezza naturale.

a una foglia inferiore; *b* una foglia superiore, *c* un fiore tutto di grandezza naturale.

d una foglia superiore, e un fiore ingranditi.

Poa ramosa

Poa nana

Verbena prostrata

Digitized by Google

Ononis mollis

C Eliganich

Biblioteca Comunale